

Vzácnější druhy vodních ptáků Tachovské brázdy v sezóně 2023

Mgr. Martin Liška
Muzeum Českého lesa v Tachově



Proč, kdy, kde a hlavně jak?



Velký podveský rybník, Tisová [TC]. Foto autor, 4. 10. 2023

návaznost na výzkum přírodovědného oddělení MČL – zvláště na dlouhodobé studie výskytu a početnosti vodního ptactva dr. Pavla Řepy

vyhlášení poláka velkého (*Aythya ferina*)
Ptákem roku ČSO pro rok 2023

probíhající monitoring šířící se rosničky zelené (*Hyla arborea*) a z něj plynoucí snaha dozvědět se co nejvíce o stavu rybniční krajiny Tachovské brázdy

a v neposlední řadě i dlouhodobý zájem autora o vodní ptactvo, jeho početnost a příčiny jeho ohrožení

Proč, kdy, kde a hlavně jak?



hnízdní sezóna (začátek května – začátek července) 2023

200 rybníků v oblasti Tachovské brázdy od Dolního Žandova a Úbočí na severu po Dehetnou a Staré Sedlo na jihu

dvě kontroly každé lokality (1. kontrola počátek V. – počátek VI., 2. kontrola počátek VI. – počátek VII.) = 400 jednotlivých návštěv!

sčítání všichni na vodu vázaní ptáci (zejména ti „hladinoví“), zaznamenávány byly ale všechny zvláště chráněné druhy, druhy Červeného seznamu ptáků ČR + další významné druhy

následně (léto 2023) proběhlo zjišťování fyzikálně-chemických parametrů vody v rybnících a na podzim 2023 dokumentace biotopů v okolí rybníků – jejich analýzy, doufejme, příště :-)




Šmatlavý rybník, Tachov (Vilémov) [TC]. Foto autor, 1. 10. 2023

všechny fotografie ptáků v prezentaci laskavě poskytl pan Pavel Štěpánek!



husa velká (<i>Anser anser</i>)				
kategorie hn.	A	B	C	celkem
1. kontrola	1	5	2	8
2. kontrola	4	1	3	8
celková početnost v TC brázdě:				8 - 12 páru
% celostátní populace druhu				0,57



husice nilská (<i>Alopochen aegyptiaca</i>)				
kategorie hn.	A	B	C	celkem
1. kontrola	1	10	1	12
2. kontrola	2	8	0	10
celková početnost v TC brázdě:				10 - 15 párů
% celostátní populace druhu				27,77





kachnička mandarínská (*Aix galericulata*)

kategorie hn.	A	B	C	celkem
1. kontrola	1	0	0	1
2. kontrola	0	0	0	0
celková početnost v TC brázdě:				0 - 1 pár
% celostátní populace druhu				2,94

čírka modrá (*Spatula querquedula*)


kategorie hn.	A	B	C	celkem
1. kontrola	1	2	0	3
2. kontrola	0	0	0	0
celková početnost v TC brázdě:				1 - 2 páry
% celostátní populace druhu				5,00





čírka obecná (*Anas crecca*)


kategorie hn.	A	B	C	celkem
1. kontrola	1	1	0	2
2. kontrola	2	1	0	3
celková početnost v TC brázdě:			1 - 3 páry	
% celostátní populace druhu			5,00	



kategorie hn.	A	B	C	celkem
1. kontrola	0	1	0	1
2. kontrola	0	0	0	0
celková početnost v TC brázdě:		1 - 2 páry		
% celostátní populace druhu		0,55		

zrzohlávka rudozobá
(*Netta rufina*)

polák velký (*Aythya ferina*)



kategorie hn.	A	B	C	celkem
1. kontrola	7	19	0	26
2. kontrola	6	4	0	10
celková početnost v TC brázdě:				15 - 30 páru
% celostátní populace druhu				0,22

hohol severní (*Bucephala clangula*)

kategorie hn.	A	B	C	celkem
1. kontrola	2	4	0	6
2. kontrola	0	0	2	2
celková početnost v TC brázdě:				4 - 8 páru
% celostátní populace druhu				4,62




chřástal vodní (*Rallus aquaticus*)

kategorie hn.	A	B	C	celkem
1. kontrola	0	2	0	2
2. kontrola	0	1	0	1
celková početnost v TC brázdě:	50 - 90 páru*			
% celostátní populace druhu	5,83**			

* metodika mapování byla pro zjištění tohoto skryté žijícího druhu nevhodná, proto jsou v tabulce započtena i data ze speciálního monitoringu, který v r. 2023 pořádala AOPK

** i celostátní odhady početnosti druhu jsou zatíženy velkou mírou nejistoty, reálné číslo může být i 10x nižší




* i u slípky platí, že užitá metoda mapování se pro zjišťování jejích počtů nehodí – skutečná situace může být o něco lepší

z dlouhodobého pohledu je trend ovšem naprosto jistě negativní!

slípka zelenonohá (*Gallinula chloropus*)

kategorie hn.	A	B	C	celkem
1. kontrola	2	0	0	2
2. kontrola	2	0	1	3
celková početnost v TC brázdě:		10 - 20 páru*		
% celostátní populace druhu		0,33		





jeřáb popelavý (*Grus grus*)

kategorie hn.	A	B	C	celkem
1. kontrola	5	4	1	10
2. kontrola	1	3	1	5
celková početnost v TC brázdě:		8 - 12 párů		
% celostátní populace druhu		11,11		


kategorie hn.	A	B	C	celkem
1. kontrola	0	4	0	4
2. kontrola	4	4	0	8
celková početnost v TC brázdě:				10 - 20 párů*
% celostátní populace druhu				1,25

kulík říční (*Charadrius dubius*)



* velká část populace kulíka říčního zřejmě v současnosti hnízdí na orné půdě (pole s kukuřicí) – takzvaně „tradiční“ hnízdění na březích vypuštěných rybníků je nyní spíš záležitost marginální!

výskyt kulíka říčního na orné půdě by si v naší oblasti zasloužil pozornost!



vodouš kropenatý (*Tringa ochropus*)

kategorie hn.	A	B	C	celkem
1. kontrola	0	0	0	0
2. kontrola	7	1	0	8
celková početnost v TC brázdě:		2 - 6 párů		
% celostátní populace druhu		6,15		

racek chechtavý (*Chroicocephalus ridibundus*)

kategorie hn.	A	B	C	celkem
1. kontrola	9	0	1	10
2. kontrola	5	0	0	5
celková početnost v TC brázdě:				5 - 15 párů
% celostátní populace druhu				0,03






orlovec říční (*Pandion haliaetus*)

zahnízdění orlovců v ČR je už dlouho netrpělivě očekáváno, v tomto kontextu je červnový údaj z Polního rybníka u Racova poměrně zajímavý...

kategorie hn.	A	B	C	celkem
1. kontrola	0	0	0	0
2. kontrola	1	0	0	0
celková početnost v TC brázdě:				0 - 1 pár
% celostátní populace druhu				/



orel mořský (*Haliaeetus albicilla*)


kategorie hn.	0	A	B	celkem
1. kontrola	9	4	0	13
2. kontrola	11	6	1	18
celková početnost v TC brázdě:	5 - 9 páru			
% celostátní populace druhu	6,36			



ledňáček říční (*Alcedo atthis*)

* sčítána jen populace na rybnících – populace na pěti hlavních tocích Tachovska (Hamerský p., Kosí p., Mže, Úhlavka, Úterský p.) v roce 2024 dosahovala nejméně 40 – 50 párů; v celém okrese může hnízdit i více než 80 párů!


kategorie hn.	A	B	C	celkem
1. kontrola	6	2	1	9
2. kontrola	10	0	0	10
celková početnost v TC brázdě:				10 - 20 párů*
% celostátní populace druhu				1,58



rákosník velký (*Acrocephalus arundinaceus*)

u všech rákosních (ne)pěvců platí, že odhadu početnosti jsou více či méně zatíženy nepřesností – sčítání se na ně vysloveně nezaměřovalo; bylo by žádoucí se jím do budoucna věnovat, už kvůli potvrzení hnízdění některých vzácnějších druhů (moudivláček lužní *Remiz pendulinus*, sýkořice vousatá *Panurus biarmicus* apod.)

kategorie hn.	A	B	C	celkem
1. kontrola	2	0	0	2
2. kontrola	3	0	0	3
celková početnost v TC brázdě:				8 - 15 párů
% celostátní populace druhu				0,55



rákosník proužkovaný (*Acrocephalus schoenobaenus*)

kategorie hn.	A	B	C	celkem
1. kontrola	17	0	0	17
2. kontrola	7	0	0	7
celková početnost v TC brázdě:				40 - 60 párů
% celostátní populace druhu				0,07



slavík modráček středoevropský
(*Luscinia svecica cyanecula*)

ačkoliv platí poznámka o nepřesnosti stejně jako u rákosníků, u modráčka je zcela nesporný dlouhodobě kladný populační trend

kategorie hn.	A	B	C	celkem
1. kontrola	1	1	0	2
2. kontrola	2	0	0	2
celková početnost v TC brázdě:		10 - 20 párů		
% celostátní populace druhu		1,00		



Nový rybník, Staré Sedliště / Doly [TC]. Foto autor, 4. 10. 2023



Hájský (Hojský) rybník, Doly [TC]. Foto autor, 4. 10. 2023



Děkuji za pozornost!